

# Avertissements agricoles

POITOU  
CHARENTES



BULLETIN TECHNIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

## GRANDES CULTURES

BULLETIN N° 99 (17/86) du 25 SEPTEMBRE

**COLZA** :: Surveiller les altises  
Tableau desherbage de post-levée

**CEREALES** : Résidus d'herbicides et J.N.O.

## COLZA

### ALTISES

L'activité des altises est peu importante jusqu'à présent.

Dès la levée et jusqu'au stade 2 feuilles vraies (B2) du colza, observer régulièrement les jeunes plantules afin de repérer les éventuelles morsures d'altises (30 % des pieds avec des morsures justifient une intervention).

Au delà du stade B 2, se baser sur les captures en cuvette jaune pour raisonner un traitement (30 à 40 captures cumulées).

### DESHERBAGE DE POST-LEVÉE

Actuellement, nous constatons de très fortes levées d'adventices, notamment de repousses de céréales dans les colzas.

Ces repousses, outre la concurrence qu'elles font à la culture constituent un réservoir potentiel pour les pucerons de la J.N.O. dont la four d'Aigre (ACTA) signale l'activité encore faible.

Il sera donc nécessaire de compléter la plupart des traitements de pré-semis post-levée avec un des produits du tableau ci-joint. Certains ne sont que des antigraminées spécifiques et d'autres offrent un spectre d'action plus large. Dans tous les cas, tenir compte du stade de la culture et des adventices.

## CEREALES

### RÉSIDUS D'HERBICIDES

En raison de l'extrême sécheresse de l'été 1986, la dégradation des desherbants de type atrazine, simazine, linuron, trifluraline, fluorchloridone, napropamide a été freinée.

Les pluies risquent d'être insuffisantes d'ici les prochains semis et des dégâts sensibles pourront être observés.

Il importe donc de réaliser un labour profond derrière les maïs, tournesols et colzas ayant reçu ces desherbants. Dans de telles situations, les desherbages de prélevée à l'aide de produits tels que chlortoluron, methabenzthiazuron, isoproturon et neburon sont à éviter, de même pour les desherbages de post-levée précoce à l'aide des mêmes spécialités en cas de déficit pluviométrique persistant.

### JAUNISSE NANISANTE

Les populations de rhopalosiphum padi sont actuellement faibles mais peuvent constituer un danger si l'automne reste doux en raison du risque de multiplication sur les repousses.

Pensez à détruire ces dernières dans les parcelles déchaumées.

Des informations complémentaires relatives à la stratégie à adopter seront développées dans le prochain bulletin.

(C) SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VEGETAUX 1986

Toute reproduction, même partielle, est soumise à notre autorisation.

759



Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt  
SERVICE REGIONAL  
DE LA PROTECTION DES VEGETAUX  
13, Rte de la Forêt BIARD  
86000 POITIERS Tél 49.58.39.02

Publication périodique - Imprimerie de la Station Poitou-Charentes  
Directeur Gérant : R. GUILLEMENET  
CPPAP n° 1664 A.D. Abonnement annuel : 115 F  
Chèque bancaire ou postal à l'ordre du  
sous régisseur de recettes Avertissements Agricoles

Matière active	Spécialité Commerciale	Dose/ha de spécialité	OBSERVATIONS
carbétamide	LEGURAME PM	3 kg	<ul style="list-style-type: none"> <li>Depuis le stade 4 feuilles vraies du colza (B4) jusqu'à 3 semaines avant la reprise de végétation.</li> <li>Application possible sur sol gelé.</li> <li>Bonne action sur graminées. Insuffisante sur dicotylédones.</li> </ul> <p>5 à 6 kg contre chiendent de novembre à fin janvier</p>
propyzamide	KERB 50 W	1,5 kg	<ul style="list-style-type: none"> <li>A partir du stade 3 feuilles vraies du colza (B3) jusqu'à 3 semaines avant la reprise de végétation.</li> <li>Application possible sur sol gelé.</li> <li>Bonne action sur graminées. Insuffisante sur dicotylédones</li> </ul> <p>2 kg contre avoine à chapelet 3 kg contre chiendent</p>
propyzamide + diuron	KERB ULTRA	1,2 kg	<ul style="list-style-type: none"> <li>A partir du stade 4 feuilles vraies bien développées, 6ème feuille naissante des colzas sains bien implantés. De préférence avant l'hiver.</li> <li>Bonne action sur graminées</li> <li>Action limitante sur Sanves, Ravenelles.</li> </ul>
carbétamide + diméfurone	PRADONE TS	3,5 kg - 4 kg	<ul style="list-style-type: none"> <li>A partir du stade 6 feuilles vraies (B6) des colzas sains et bien implantés.</li> <li>Application possible sur sol gelé.</li> <li>Bonne action sur graminées (dont repousses de céréales)</li> <li>Une action sur dicotylédones : Efficace sur : Véroniques, Mourons, Céraistes, coquelicot Irrégulier sur : Matricaires, gaillets</li> </ul>
alloxydime-sodium	FERVIN + Huile	1 kg + 3 l. huile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Quel que soit le stade du colza.</li> <li>De la levée jusqu'au stade début montaison des graminées</li> <li>Application de préférence sur végétation active (en soirée si temps sec).</li> <li>Action essentiellement sur graminées (sauf Paturin)</li> </ul> <p>1,0 à 1,25 kg + 3 l. huile contre graminées vivaces.</p>
fluzifop-butyl	FUSILADE + AGRAL	1,25 l. + 0,1 % vol. bouil.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Quel que soit le stade du colza</li> <li>De la levée jusqu'au stade début montaison des graminées.</li> <li>Application de préférence sur végétation active.</li> <li>Action essentiellement sur graminées (sauf Paturin)</li> </ul> <p>3,0 l. + Agral (0,1 %) contre graminées vivaces.</p>
sethoxydime	FERVINAL	2 l. + 3 l. huile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Quel que soit le stade du colza</li> <li>De la levée jusqu'au stade début montaison des graminées.</li> <li>Application de préférence sur végétation active (en soirée si temps sec)</li> <li>Action essentiellement sur graminées (sauf Paturin)</li> </ul> <p>3,0 l. + 3,0 l. huile Schéring contre graminées vivaces</p>
fluzifop-p-butyl	FUSILADE X 2 + AGRAL	0,7 l. + 0,1 % vol. bouil.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Quel que soit le stade du colza.</li> <li>De la levée jusqu'au stade début montaison des graminées.</li> <li>Application de préférence sur végétation active (en soirée si temps sec)</li> <li>Action essentiellement sur graminées (sauf Paturin)</li> </ul> <p>1,5 l. + Agral (0,1 %) contre graminées vivaces.</p>
haloxyfop-éthyl	GALLANT	1,0 l.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Quel que soit le stade du colza</li> <li>De la levée jusqu'au stade début montaison des graminées.</li> <li>Uniquement à l'automne</li> <li>Application de préférence sur végétation active (en soirée si temps sec).</li> <li>Action essentiellement sur graminées</li> </ul> <p>2,0 l. contre graminées vivaces et Paturin</p>
quizalofop-éthyl	TARGA + huile	1,25 l. + 2,0 l.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Quel que soit le stade du colza</li> <li>De la levée jusqu'au stade début montaison des graminées.</li> <li>Application de préférence sur végétation active (en soirée si temps sec)</li> <li>Action essentiellement sur graminées (sauf Paturin)</li> </ul> <p>3,0 l. + 2,0 l. huile Schéring contre graminées vivaces.</p>